

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด

ข่วน

เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- บิเสียงเปลี่ยน ไม่ร้อง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาระแวง บ่นตายยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- หัวค้อน

- บ่าลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

อย่าแหย

อย่าเหยียบ

อย่าแยก

อย่าหยิบ

อย่ายุ่ง

คาถา
๕ย
กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ



หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
เปล่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค
ผู้ติดเชื้อมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด